

**DE MORBIS
CUTANEIS IN
GENERE
DISSERTATIO
INAUGURALIS...**

Simon Batsehes



DE Morbis Cutaneis

IN GENERE
DISSERTATIO INAUGURALIS

QUEM
ORDINIO ET AUCTORITATE PRÆLUCENTIS DIRECTORIS
AC PRÆCISIS FACULTATIS MEDICÆ SPÆCIALIS HOMINIS
DECANI PÆC. MD. CLXXXVIII. R. M. PROFESSOREM ET
DOCTOREM MEDICINÆ LAUREA PÆCENDE IN MEDICINÆ
HOMINIS AC PÆCULI ARTE COMMODITATE IN ANTI-
QUARIIS AC CELEBRARIIS UNIVERSITATIS THOMAS

AUSPICE

D. DOCTORE THEODORO HELM

*Clinicus Medicus Therapeuticus Specialis Prof. P. O.
Director Anatomical Universitatis etc. etc.*

UNA CUM THESISIBUS DEFENDENDIS

MEDICÆ PÆCULI ANNO 1845

PUBLICÆ DISCUSSIONI SUBMITTIT

SIMON BATSCHES

Gallicanus Leopoldina.



TICINI REGII
EX TYPOGRAPHIA FRIE ET SOCIJ



VIRO PRAEstantissimo

DOMINO DOMINO

Arnoldo Soepé

MEDICINAE DOCTORI

OBSEQUII REVERENTIAE

ET

GRATI ANIMI CAUSA

TENTAMEN HOC INAUGURALE

HUMILITER

OFFERT

LEIPZIG.



Omnia affectio quae physico-vitales cutis conditiones laedit morbum cutaneum statit. Iste morbi aliisque nominibus appellantur atque generatim sub exanthematibus, efflorescentiis cutaneis, impetiginis etc. nomine veniunt.

Cutis externum totius corporis involacrum praebens, ex pluribus partibus composita, textu nempe cellulari, vase sanguifero, lymphatico, nervis, glandulis sebaceis, pigmento, epidermide etc. maxime sensibilitate dotata multiplicibus functionibus inserviens constantem cum potentia externis certamen sustinens strictissime cum internis organismi partibus textu derivata, nil mirum si tot atque diversissimis morbis obnoxia sit. Quibus parte textus ex quibus cutis componitur, nec non appendices ejus; uti pili, ungues specierum morborum sedem sistant.

Quamvis generatim ad morbos cutis dispositio in homine est; tamen haec quantitative et qualitative a diversis momentis modificatur; ita non tantum varietas individuum, sed diversae regiones et diversa substrata integumentum communi varium gradum praedispositionis ostendant.

Haec differentia dispositionis ad morbos cutaneos in diversis subjectis, praedispositio nempe individualis a sequentibus momentis dependere videtur.

1.^a *Paries* hominum, ita ut alba atque vasorum abundans cutis Caucasi, flavum integumentum Mongoli, nigrum Aethiopie et captivum Americani variis morbis aggrediatur.

2.^a *Aetas*. Quarta aetas ad proprias deformationes cutis disponit, ita juvenas ob majorem abundantiam vasorum cutis maximam proclivitatem ad morbos exanthematicos manifestat.

3.^a *Sexus*. Quarta cutis conditio in utroque sexu quodammodo differat, utamen nullus datur systematis extensi morbus, qui sexui uni alterive excludere proprius dici possit. Plurimi vero morborum cutis longe frequentius feminas invadunt, quam viros.

4.^a *Constitutio corporis*. Sunt morbi cutis, qui nulli fere constitutioni corporis parcent; sunt qui praecipue vel debiles vel robustos aggrediuntur. Praeterea consuetudinem hominum cutis, ita constituta est, ut a quacunque domini causa sive externa sive interna facillime morbis cutaneis afficiatur.

5.^a *Opificum*. Ob immundiciam, aliquando specifiham, nec non ob alias causas, opifices haud pauci morbis cutaneis subjiciuntur; exemplo sint textores, sutores, pictores, nautae, mercatores vellum antiquarum, lotrices, soci-

ges, lueses, rustici etc. qui variis morbis cutaneis disponantur etque delatigantur.

6.^o *Cultura cutis.* Quo magis cutis mundities negligitur, eo facilius morbi cutanei supersedant, eo quod substantia mucosa quae in cute cumulat chronicas irritationes provocat, sive etiam eo quod perspiratio cutanea impediatur et pervertatur indole.

7.^o *Alimentorum in cutem influxus* jam antiquissima medicina notum fuit, nam ab usu nonnullorum ciborum uti picium, pinguedinum etc. plures impetigines oriuntur.

8.^o *Temperata, genus epidemicum.* Ita dominant praecipue tempore vernali et aestivo morbi exanthematici v. g. scarlatina morbilli etc. et contra autumno et hieme, morbi cutanei tam acuti tam chronici de die in diem immigantur.

9.^o *Transpiratio cutanea.* Uberrimum morborum cutis feotem debet transpiratio, aut suppressa, aut nimis, aut indole peccans. Adfectiones cutaneae praecipue in alterata indole aliarum secretionum originem agnoscunt.

10.^o *Sanguis.* Plurima facta nos docent, sanguinem, sive nimium, sive retentum, sive extravasatum, sive deficientem, sive alio modo peccantem, inter causas morborum cutaneorum praecipuum occupare locum.

Haec delibata relate ad praecipua momenta disponantur adfectionis cutaneae, modo aliqua de causis occasionalibus proficere.

MOMENTA OCCASIONALIA CUTIS MORBORUM SUNT.

1.^o Momenta mechanica uti: densitas, vel tensus cutis maxima.

2.^o Momenta atmospherica uti: lux, electricitas, aer siccus humidus, et pressuris improvisae aëris et temperiei mutationes dum corpus sit actum et modicum.

3.^o Momenta chemico-dynamica.

Per resorptionem substantiarum irritantium, et equaliter indolis noxiae.

4.^o Momenta mere dynamica.

Hae referuntur terror improvisus, insomnis terribiles, animi pathemata, et sic porro.

5.^o Momenta sympathica.

Utpote essent: maculae biliosae in morbis diversis hepatis.

6.^o Contagia uti: scarlatina, morbilli, variola etc.

Morbi cutanei diversae sedem agnoscunt, et hoc intuitu numerantur.

1.^o Morbi cutis.

2.^o Morbi pilorum.

3.^o Morbi ungium.

Relate porro ad morbos qui cuti insident: sunt nonnulli qui sedem figunt in epidermide, vel corio, ut rete Malpighii, alii in glandulis sebaceis.

Indoles morborum cutis adhuc alia absolvitur caligine, et etiam quoad formam harum affectionum diversae adhuc doctorum sententiae pro-

feruntur. Ut aliquo tunc ordine procedam in hacce dissertatione vestigia clarissimi Professoris Fuchs sequi mihi perplicuit, et proinde diversas systematis cutanei morbos sequenti ratione distribuere optimum habeo.

DIVISIONES QUODAM FORMAM.

Relate ad formas morborum cutaneorum distinguuntur.

1.^a *Maculae*. Super cutem non elevatas plus minusve circumscriptas cutis ipsius decolorationes sunt. Sedem vel in rete vasorum capillarium, vel in corio aut in mucos Maltighii habent.

In primo casu rubescunt, atque digito premante evanescent, in secundo autem diversi coloris sunt, atque digito comprimente persistent.

2.^a *Squamae*. Sunt lamellae albescentes et opaeae a cuti secedunt et pendent ab adhaesita et perversa epidermide.

3.^a *Pustulae*. Sunt turgescensiae partiales cutis irregulares, quae in superficie phlogionem habent, et sunt vel rubescunt vel ejusdem coloris cutis.

4.^a *Papulae*. Sunt miculae atque acuminatae prominentiae cutis sub epidermide cum basi inflammata, nullum liquidum continentes, quae plerumque desquamatione surfacem terminantur.

5.^a *Vesicae*. Sunt parvae prominentiae epidermidis, fluidum serosum et pellucidum continentes.

Sedem præcipue in membrana vasculari figunt, et ab epidermide circumdantur.

6.^o *Bullae*. Sunt magnae prominentiae epidermidis, formae irregularis limpido fluido repletæ.

7.^o *Fistulae*. Sunt elevationes epidermidis figurae nunc globosae, nunc conicae, pus aut lympham continentes.

8.^o *Tubercula*. Sunt eminentiae durae carnosae cutis sine fluido quae nullam dispositionem ad suppuracionem manifestant, figurae haemisphaericae et nullam secretum continent.

9.^o *Fungi*. Excrementis molles carnosae nullum fluidum continentes coloris varii. Occupant potissimum coriam.

10.^o *Phymata*. Sunt tamens densi, magni, rotundi, irregularis figurae, sedem præcipue in textu cellulari agnoscunt, et libere moventur.

DIVISIONES QUODAM RATIONE.

Hec sub intuitu distinguuntur in tres classes.

1.^o Morbi cutanei qui primitivum sedem in cute, atque nullam nexum cum interioribus organis habent, ita ut corporis integumentum idiosyncratico modo affectum quasi focus horum sistunt et dominantur.

Dermatores.

2.^o Morbi qui non ab affectione primaria cutis, sed a dyscrasia sanguinis pendunt, et cutis

nomini receptaculum partium morbosarum a sanguine segregatum sinit; — Vocantur *Dermatoporeæ*.

3.^o Affectiones autem cutis cujus fomes nec in dispositione morbose cutis, nec in dyscrasia sanguinis querendus est, sed a proprio contagio in internis membranis organismi orto dependent, cum febris incidant, et si ad altiorem gradum evolvantur etiam cutis in participationem trahant; nominantur *Dermexanthæzæ*.

CLASSE PRIMA DERMATOSIS.

Character hujus classis consistit in eo quod huius morbi cutis semper independentes ab internis organis sunt, et febris dant, vel si febris occurrat, semper secundario modo ab affectione locelli ingeneratur.

Raro morbi hujusmodi symptomata aliorum morborum sistant.

Processus morbosus a quo cutis idiopathice afficitur, triplici modo induci potest, nimirum aut per formam morbosam cutis, aut per indolem sanguinis alienatam, aut per systema nervosum affectum. Hinc hæc classis tres ordines complectitur nempe 1.^o Morphosæ 2.^o Hematosis 3.^o Nervosæ.

ORDO PRIMUS MORBOSAE.

(Formae morbosae.)

Characteres sunt sequentes :

1.^o Cutis sollemniter afficitur, quin singula et nervorum systema in compositionem trahantur.

2.^o Non tantum epidermis sed etiam pigmentum cutis, pili et ungues afficiuntur.

3.^o Congenita cutis alteratio per excessum vel defectum adest.

Haec alienatio jam in embryone locum habere potest.

4.^o Morbi huius ordinis pertinentes nunquam texturam internam cutis mutant.

5.^o Vasa cutis nunquam morbose afficiuntur, sed mechanico modo alterantur e. g. per vulnera.

6.^o Nervi cutis tum manifestant dolorem, quando mechanico modo laeduntur, tum per hypertrophiam comprimuntur.

7.^o Perspiratio cutanea, ac et excretio cutis atque sensibilitas nunquam mutantur.

Aetologia. — Nonnullae formae morbosae sunt adhaerentes, aliae per potentias nocivas provocantur.

Non raro causa nocentibus adhuc ignota evolvantur.

Decursus harum morbosarum, excepto valde saepe est chronicus.

Exitus. — In morbis hujusmodi neque ulla complicatio, neque prognostica currit infausta. Si vero aliae affectiones superaccendant, judicium prognosticum pro diversitate casus plus minusve reservatum profereendum venit.

Cura semper palliativa est, et in multis casibus ars ullam medicinam afferre valet. Remedia interna frustra adhibentur.

Hic ordo comprehendit quatuor familias naturales.

1. Teratoses (vitia adnata).
2. Hypertrophias.
3. Atrophias.
4. Traumatosis (vulnera).

FAMILIA PRIMA TERATOSIS.

Characteres. — Morbi hujusmodi familias semper tempore evolutionis foetus in utero adhuc inclusi oriuntur. Functio entis non turbatur.

Morbi hujusmodi familias durant per totam vitam.

Aetologia. — Momenta occasionalia adhuc sunt obscura; quid autem nobis de horum morborum generi notum est ad sequentia momenta reducenda sunt :

1.^o Infantes parentum debiliorem arduius haec deformitates ostendunt.

2.^o Omnes formae hujusmodi familias facilius feminas quam viros aggrediuntur.

3.^o Sunt deformitates non raro hereditariae.

4.^a Vehementes affectus psychici matris hanc deformitatem favent, uti hœstia, terror sollicitudo, etc.

5.^a Victus pravi, esse remedium narcoticorum, potus spirituosus, et omnia alimenta nociva, quæ mater tempore graviditatis in usum trahit, inter potiores momenta disponentis et occasionalia harum deformitatum habentur.

Decursum.

Tertiores per omnem vitam durant, nisi ars in auxilium vocetur.

Prognosis. Pauci eorum vitæ periculum adducunt uti: Adernia — necres sanguinis.

Cura. Estet indicatio, defectum aliquas partis organismi restituere, et excessum removere. Primæ indicationi nullo pacto satisfacere possumus; alteri vero ars emolumentum afferre potest.

Hæc familia dividitur in duas cognationes nempe: dysmorphoses et heteromorphoses.

Cognatio 1.^a Dysmorphoses (vitia per defectum)
Sunt vitia per defectum a retenta evolutione.

Comprehendit quatuor genera:

G. 1. Adernia (defectus cutis)

G. 2. Albinismus (defectus pigmenti)

G. 3. Atrophia (defectus plævæ)

G. 4. Anonychia (defectus unguis)

Cognatio 2.^a Heteromorphoses.

(vitia per excessum cutis)

Sunt vitia per excessum propter luxuriantem evolutionem.

Continet etiam quatuor genera.

G. 5. *Nævus* (macula cutanea)

G. 6. *Ophthalmia* (exortucentis oculis adnata)

G. 7. *Polytrichia* (hirsuties adnata)

G. 8. *Palonychia* (exerius unguium)

FAMILIA SECUNDA HYPERTROPHIE.

Characteres.

1. Pars aliqua cutis, aut plura eorum manus volumine, magnitudine, solida, crassitie adeo a norma deficiunt, ut manus organos majores volumine gaudeat quam in statu normali sine qualitates permutatione tenet.

2. Incrementum cutis sit paulatim, atque irritabile, congestionis aut inflammationis atque sine robore.

3. Hypertrophie nunquam majoris extensionem assumunt, et quasi semper formam circumscriptam habent.

4. Functio cutanea minime turbatur.

5. Demorss eorum semper sine perturbatione functionum organorum interiorum atque febri-
lis et chronicus erudit.

Ætiologia. Cutis molle atque tenere majori dispositioni ad hypertrophiam gaudet. Momenta autem occasionalia sunt efficientia mechanica; ut pressio continua. Attamen dantur forme hujusmodi, quæ sine pressione oriuntur.

Decursum. Semper chronicum est.

Prognosis. Omnes hypertrophiae cutis sunt periculo expertae.

Cura. Producta quae per potentias mechanicas oriuntur, facile per ablationem eorum mutantur. Si ad altiorum gradum evadant, caustica directe conveniunt, vel hocias ac certius cultro chirurgico radice extirpanda sunt.

Genera hypertrophiarum sunt sequentia :

- G. 1. Tyloma (Callositas)
- G. 2. Clavus (Spina pedum)
- G. 3. Dermatokeria (Cornus humana)
- G. 4. Verruca.
- G. 5. Frigidae (Hirsuties)
- G. 6. Onychiae (Hypertrophia unguium)

FAMILIA TERTIA ATROPHIAE.

Characteres.

1. Pars cutis, praecipue pigmentum aut appendicem ejus tabescunt, quin tamen functio atque testis cutis turbetur.

2. Tabescentis pigmenti, unde color cutis et pilorum mutatur.

3. Atrophis appendicum cutis uti; unguium pilorum oritur per minorem nutritionem eorum et tandem decidunt.

4. Atrophiae decurrunt semper ubique perturbatione internarum partium chronicae atque afebriles.

Ætiologia.

Cutis atrophica præcipue ætate prosecta locum habet, quandoque autem individua etiam juvenilia aggrediuntur; crebrius ætas virilis quam feminæ afficitur, et in nonnullis individuis prædispositio hæreditaria invenitur.

Momenta occasionalia adhuc ignota sunt, tamen videtur momenta psychica insignem influentiam habere.

Decursus hæc semper est chronica, tamen intercurrentur curæ sæpi, quæ facili negotio in chronicam decursam quoque revertuntur, et per integram durant vitam, sine ullo periculo, atque perturbatione functionum internarum.

Prognosis fausta est.

Cura.

Nulla datur rationalis neque empirica indicatio therapeutica, eo quod morbi incurabiles sunt.

Ad hæc familiam quatuor genera numerantur.

Gen. 1. *Achromia* (*Chloasma album*)

Gen. 2. *Polioides* (*Cauties*)

1. V. *Polioides* acilla.

2. V. *Polioides* præmatura.

3. V. *Polioides* circumscripta.

Gen. 3. *Alopecia* (*Calvitia*)

1. V. *A.* acilla.

2. V. *A.* præmatura.

3. V. *A.* circumscripta.

Gen. 4. *Onychotrophia* (*Scabrities ungium*)

FAMILIA QUARTA TRAUMATOSÆ.

(*Vulnere cutis*)

Characteres. 1. Morbi hujus familie per potentius mechanice atque lesionem manus organice, plus minore producuntur.

2. Si epidermis, ungues et pili lacerantur, nullus dolor, neque sanguinis fluxus locum habet ob defectum nervorum atque vasorum in hisce partibus.

3. Vulnere cutis dolet atque sanguinem mittit. Quandoque simplices rugillationes occurrunt, dum epidermis illam sanat, uti in contusionibus videndum est.

4. Si corium densitatem amittit aut laceratur, margines ad latera hieot, et retrahuntur, ita ut jectura manus cutis in locum emergat.

5. In locis ubi cutis afficitur, motus atque cutis functio plus minusve lacerantur, atque primo tempore ad circuitum vulneris, secretio et sensibilitas normalis est, parvo ob medicamentorum vires nature plures mutationes oriuntur.

Ætiologia. Cutis sicuti organum externum plurimè potentius molivis abradit est, hinc cutis manuum faciei lacerationibus maxime subjiciuntur.

Decursus. Sempet acutus est, ubi per complicationes et curas moram patiuntur.

Exitus. Vulnere vel in perfectam sanitatem, vel in alios morbos, aut in mortem transeunt.

Prognosis. Vulnere simplici omni periculo caret; ubi vero complicata sit, tunc praesagium modo notatum, modo infelix requiritur pro circumstantiarum diversitate.

Cura. ad forum chirurgicum pertinet.

Genera sunt duo.

G. 1. Excoriatio.

G. 2. Dermatozouma (*Vulnus collis*)

omni secusbus malisnotos.

(*Morbi sequens esse*)†

Characteres. Morbi ad hunc ordinem spectantes, semper primarii sive idiopathici sunt, sedem suam habent in systemate sanguifero cutis: aliquando tamen etiam raro secundarii sive sympathici evadunt; quo in casu quoque systema nervosum in compassionem trahitur. Sanguiis vero duplici ratione peccare potest, quoad quantitatem semper et quoad qualitatem; propterea et secretiones quae semper a sanguine peraguntur diverso modo aberrare possunt; ita sub congectione non tantum locus habent depositiones partium colorantium, quarum in gratia color cutis mutatur, sed etiam propter largamcutiam forma mutatur.

Itae vero mutationes morbosae topicae sunt, videlicet ad unum tantum cutis plagam correct-

tur; systema tamen nervosum cutis haud raro in consensum vocatur.

Aetiology.

Omnes homines cuti sensibili praediti in hoc dependentur aegritudines, et quo majori cutis irritabilitate donatur, eo facilius efficiuntur.

Ad causas occasionales referuntur illa omnia momenta, quae rari sanguiferi irritare valent.

Decursum horum morborum modo scitus modo chronicus est.

Exitus. Pro diversa morbi gravitate, extensione et complicatione, diversum nascuntur exitum, licet aliquando in ipsam mortem abeant.

Prognosis. Si aegritudo simplex atque recens est, tunc prognosim felicem admittit; sub oppositis circumstantiis infestam postulat.

Cura. Semper teples requiritur; si vera reactio febrilis locum habet, tunc methodus anti-phlogistica generalis indicatur.

In tres familias luti morbi partiantur nempe:

1. Eczematosae.
2. Phlogosae.
3. Typhoides.

FAMILIA QUINTA ECZEMATOSAE.

(*Scorietiones morbosae*)

Characteres.

1. Processus morbosus semper est idiopathicus sive primarius.

3. Ad majorem vel minorem cutis plagam extenditur.

3. Secretio cutis est quantitativo et qualitative modo alienata.

4. Systema nervosum raro in participationem vocatur.

Aetiology.

Momenta occasionalia, sive interna sive externa esse possunt.

Ad interna referantur 1.^{mo} aetas. 2. Sexus 3. conditio cutis.

Ad externa. 1. Incitamenta, uti calor, frigus, unguenta etc. pertinent. 2. Cutis neglecta munditia.

Descriptio.

Isti morbi magis deorsum chronicum quam acutum praediligunt.

Exitus. — In sanitatem, vel in alios morbos, vel tandem in mortem terminantur.

Cura. — Rationalis esse debet, pro diversitate causarum varia medendi methodos requiritur.

Prognosis. — Jam diximus hosce morbos diversos exitus nonnisi; ita diversum pariter prognosin postulant.

Haec familia quinque cognitionem comprehendit.

Cognatio prima Ehidroses (Sudores anormali)

Affectiones sunt in quibus transpiratio cutis idiopathico modo quantitativae ac qualitativae ab-

nota est, sine mutatione coloris atque taturae cutis ipsius:

Genera sunt sequentia:

- Gen. 1. Hyperhidrosis (sudor profusus)
- Gen. 2. Chromidrosis (sudor coloratus)
- Gen. 3. Bromidrosis (sudor foetens)

Cognatio secunda Acarpor.

Sunt aberrationes idiopathicae secretoriae cutaneae, quae cum maculis sive papulis aut vesiculis se produunt et oriuntur vel per congestiones, vel per morbosam depositionem pigmenti aut epidermidis.

Genera sunt sequentia.

- Gen. 4. Amorpho (Intertrigo)
- Gen. 5. Leutigo.
- Gen. 6. Chloasma.
- Gen. 7. Argiria.
- Gen. 8. Pityriasis (Porrigo)

Cognatio tertia Polycarpae.

Ita vocantur cutis affectiones per morbosam affectionem secretoriae ortae, quae in communi macula plures partes cuticulatae praebent, deinde exsiccantur et in crusta una efformantur.

Genera.

- G. 9. Psoriasis (Scabies vicia)
- G. 10. Lichen.
- G. 11. Herpes.
- G. 12. Impetigo.

Cognatio quarta Monocarpae.

Secretiones morbosae cutis, quae partes circulares septuaginta rubrae maculae efformant in quarum centro eminentiae majores quam in praecedente cognatione observantur, quae pariter in crustam usam efformantur.

Genera.

Gen. 13. *Strophalos.*

Gen. 14. *Pydracin*

Gen. 15. *Ecthyra* (*Postala*)

Gen. 16. *Acan.*

Cognatio quinta Seborrhoeae.

(Secretiones morbosae gland. sebacearum)

His veniunt cuti affectiones, in quibus functio glandularum sebacearum quantitative et qualitative a norma delinquit.

Genera sunt.

Gen. 17. *Comedo.*

Gen. 18. *Seborrhagia.*

FAMILIA SEPTIMA PHLOGOSIS.

Characteres.

1. Phlogosis semper primariae vel idiopathicae sunt, et nunquam ab aliquo processu phlogistico organorum interiorum oriuntur.

2. Phlogosis cutis ad hanc familiam pertinentes semper topicae sunt, videlicet unam tantum

cutis plagam efficiant, partes enim tument', re-
bent, calent et dolor variat.

3. Cutis densior erudit.

4. Secreta partis affectae est suppres, cutis
siccior erudit.

5. Systema nervosum affectum se praebet per
sensum doloris, ardoris, pruritionis, pulsationis
in parte affecta.

Aetiology. — Phlogosibus externis magis ob-
noxiae sunt illae partes, quae potentia externis
faciles afficiuntur, atque cuti teneriori ac sensi-
biliori donantur. Ad causas occasionales referuntur
compressiones, contusiones, calor, frigus, nec non
chemica adhaerentia.

Decursum. — Acutus, vel chronicus esse potest.

Exitus. — Vel in sanationem, vel in alios mor-
bos uti gangraenam, vel in mortem transit.

Cura. — Antiphlogistica requiritur.

Ad genera pertinent.

Gen. 1. Dermatitis.

Gen. 2. Phyma. (Infl. furunculosa.)

1. V. Phyma simplex.

2. V. " Furunculus.

3. V. " Hordeolum.

4. V. " Pernio.

Gen. 3. Paronychia (Paracitium)

FAMILIA SEPTIMA TYPHOIDES.

(lat. septies)

Characteres.

1. Restringuntur ad parvam cutis plagam, si autem ad majorem extendantur superficiem, tunc morbus ab aliqua affectione organorum interiorum pendet.

2. In omnibus typhoidibus tria stadia distincta habentes, videlicet; primum congestiva, secundum productionis morbosae, tertium sanguinis dyscrasiae, vel mutatae indolis.

In stadio primo pars ista quoque habet, hic rubor cutis, modo fusca, modo Extrema est, ac digito premente disparat; in secunda oriuntur producta, quae valde differunt ab illis in phlogosi normali generatis, et cutis quoque tumida fit; in tertio stadio vel dyscrasiae inflammatio immiscetur, et e contra sphacelus oritur.

3. Inchoante tertio stadio, evolvitur febris, quae characterem torpidum sive typhosum induit.

4. Systema nervosum non tantum partis affectae; verum quoque universale in consensum trahitur.

Aetiologia. — Praeter dispositionem peculiarem, quae in aliquibus adservitur, peculiarem attentionem merentur miasmata quae illas excitant valere.

Decursus. — Semper acutus est.

Exitus. — Abire possunt in sanitatem, in alios morbos, vel in mortem.

Prognosis. — Valde reservata requiritur.

Cura. — Distingui debet in prophylacticam et therapeuticam, ad postremam referuntur diversae auxilia pro vario morbi studio; ita in primo congestio moderari debet; in secundo producta morbose eliminanda sunt; in tertio processus gangraenosus compescendus est per antiseptica.

Genera sunt sequentia.

Gen. 1. Anthrax (Carbunculus)

G. 2. Trumaticae (Congrua necronialis)

G. 3. Noma (Cancer aquaticus)

G. 4. Filaria (Vermes cutis)

ORDO TERTIUS NEURONORES CUTIS.

Characteres.

1. Vita systematis nervosi primario modo, sive idiopathice patitur, vel saltem a norma debilitatur; facultas vero sentiendi morbose adfecta est.

2. Sensibilitas tunc morbose adfecta, tunc laesata est, primo in casu exurgit dolorosa sensitio, in secundo casu autem habetur Anaesthesia.

3. Systema vasorum nunquam in compactionem trahitur; ubi vero hoc contingat, solummodo per organum simplicem se manifestat.

4. Partes quae nervositas corripuntur, secretionem, temperiem, calorem normalem praebent.

Aetilogia. — Individua majori cutis sensibilitate praedita magis obnoxia sunt nervositas cutaneis; istae vero aliquando a momenti atmosphæricis, alias a mechanicis excitantur.

Decursum semper chronicus est; levior vero est decursus in formis cum sensibilitate morbose exaltata; nunquam vero per annum ultra decursum continuant.

Prognosis variat pro diversitate momentorum.

Cura diversa requiritur, pro uti sensibilitas exalta, vel imminuta est; ita sub exalta sensibilitate optime praestant narcotica sedentia; ubi vero sensibilitas imminuta est, tunc jussu stimulantia.

Ad hunc ordinem pertinet una familia.

FAMILIA OCTAVA NEUROSES.

Characteres hujus familiae Idem sunt ac illi ordinis.

Genera sunt sequentia.

Gen. 1. Dermatopsia (Febris intermittens
lata in cute)

G. 2. Dermatalgia (Neuralgia cutanea)

G. 3. Anaesthesia.

CLASSIS SECUNDA DERMATOPATHIAS.

(*Dermatosis*)*Characteres.*

1. Morbi qui ad hanc classem referuntur, nonquam cutim primariè ratione, sive idiopathice adfectam præbent, sed semper secundario modo propter alteram sanguinis crasim, quæ ab aliquo processo morbozo organorum interiorum dependet.

2. Semper symptomata morborum interiorum sistunt.

3. Producta quæ in cute deponuntur pro diversitate adfectionum organorum interiorum à quibus generantur variant; ite ut modo sit sanguis, modo serum, alius latex, alius hila.

Ætiologia. — Duplex habetur origo horum morborum, nunc scilicet natura evolvuntur, alius accedente aliquo contagio.

Decursus semper chronicus est.

Exitus. — Dermatoses, vel in perfectam sanitatem, vel in alios morbos, aut in mortem transeunt.

Prognosis. — Semper reservata est, alius dermatoses sunt difficilis sanationis, alius periculo stipentur.

Cura interna semper requiritur, atque contra morbos internos à quibus sanguinis dyscrasia pen-

det dirigenda est; necnunquam vero et remedia externa optimum effectum praestant.

Hae classis in duos ordines partitur, videlicet in simplices et specificas.

ORDO PRIMUS DERMATOSTASES SIMPLICES.

Characteres.

1. Cuius primario modo, nunquam adscitur, sed producta morbos a partibus internis ad haec transferantur.

2. Haec producta corpori heterogenea minime sunt.

3. Dicta producta non tantum in cute deponuntur, sed etiam in organorum parenchymate, ob hanc rem dermatostases periculosas evadunt.

Aetiology. — Processus morbosus non ab aliquo minime vel contagio, sed sponte oritur; facilius pueri ac senes huius morbis aggrediuntur; pauci sunt hereditarii.

Decursum esse potest acutus, subacutus vel chronicus.

Exitus. — Vel in sanitatem, in alios morbos, vel in mortem terminant.

Prognosis valde reservata esse debet.

Cura. — Per remedia interna conatur angustia dyscrasiam corrigere.

Divisiones. — In septem familias partiuntur.

FAMILIA NOVA HAEMATOCYTOSES.

Charactera.

1.^o Sanguinis dyscrasia habetur.

2.^o Sanguis qui e venis emittitur colorem praebet fuscum, caeruleo-roseum, nigro-roseum uti in cyanosi et scorbuto.

3.^o Color cutis peculiaris est.

4.^o Nullus dolor adest.

5.^o In nonnullis casibus maculae per universum corpus diffunduntur, in aliis ad unam tantum plagam cutis coloreantur.

Aetiology. — Oriuntur semper sponte, nonnumquam a contagio gignuntur; infantilem et senilem, uti jam dicti, praediligunt aetatem.

Decursus. — Generatione chronica tenent decursum, tamen exceptiones fieri debent, uti e. g. purpura.

Exitus. — In sanitatem, in alios morbos, vel tandem in mortem abire solet.

Prognosis. — Praesagium non solum reservatum, sed saepe esse debet.

Cura. — Partim in prophylacticam et therapeuticam. Quoad primam causae vitare, quoad secundam sanguinis dyscrasiam currigere.

Genera sunt sequentia.

Gen. 1. Cyanosis

» 2. Pseudomalestaris

» 3. Purpura.

» 4. Scorbutus

» 5. Sclerosis

FAMILIA DECIMA MELANOSIS.

Characteres.

1.^a Sanguis majorem quantitatem continet principii colorantis et carbonii.

2.^a Sanguis materiam propriam melanoticam in diversis organis deponit.

3.^a Apudhas melanotice colorem semper nigrum exhibent; atque sunt maculae non elevatae sub epidermide posita; paulatim efformantur, ac sine dolore.

4.^a Praedicti sunt: debilitas, decessatio, et habitus corporis cachecticus.

Aetiology. — Senes atque debiles majori dispositione praevalent in melanosim. Momenta occasionalia adhuc obscura sunt.

Decursum. — Semper chronicus est.

Exitus in alios morbos, vel in mortem desinit.

Prognosis valde ambigua requiritur, incertam enim adhuc est, an absorptio et rursus moitus contingere possit nec ne.

Cura. — Rationalis therapia instituenda est.

Ad hanc familiam pertinet.

Gen. Melasma.

FAMILIA UNDECIMA HYDROPSIAE.

Characteres.

1.^a Sistunt in peculiari sanguinis dyscrasia, quae abundanter seri effusione comitatur.

1.^o Illico seri secretio sine dolore contingit.

2.^o Incedunt semper cum colore pallido cutis, et habitu corporis cachectico.

Aetiology. — Principes ante pubertatem hydropes oriuntur, et praesertim evolvuntur in individuis scilicet atque temperamento phlegmatico praeditis. Momenta occasionalia sunt illa omnia, quae viscerum vitam deprimunt, et seri praesectionem in sanguine promoveant.

Decursum acutus vel chronicus est, atque ad tempus haud statutum protrahitur.

Exitus vel in sanitatem vel in mortem fuit.

Prognosis valde reservata, vel quoque incerta esse debet.

Cura. — Momenta casualia removenda, sanguinis dyscrasia corrigenda, atque seri absorptio promovenda est.

Ad genera refertur sceleratè Anomala.

FAMILIA DUCOBICHA CHYMOPLASIAE.

(*Metastasis secretoria*)

Characteres.

1.^o Mixtio sanguinis mutata est.

2.^o Secretio cutis qualitative modo est alterata.

3.^o Adfectiones aliquando ad usum tantum plagues restrictae sunt, alias ad majorem cutis superficiem extenduntur.

Aetiology. — Deponent in chymoplasias aetate juvenilis et senilis, temperatae aetatis, mor-

menta occasionalia in depressione functionum organorum interiorum querenda sunt.

Decursus. — Decursus potius chronicum quam acutum praediligunt.

Exitus. — Vel in sanitatem, vel in alios morbos, aut in mortem transeunt.

Prognosis. — Generatim haud infesta est.

Cura. — In primis causas removendas, dein secretiones suppressas sollicitandas sunt.

Haec familia in quatuor cognationi seungitur.

Cognatio prima Chloroplania.

(*Metastasis bilis*)

Characteres.

- 1.^o Secretio bilis imminuta vel suppressa est.
- 2.^o Sanguis cum bile coagulatus habetur.
- 3.^o Principia bilis a sanguine in diversis organis et potissimum in cute deponuntur.
- 4.^o Color in universa cute flavescens est.

Ad hanc cognationem pertinent

Gen. 1. Icterus.

Varietates.

V. 1.	Icterus	Neonatorum
V. 2.	"	Infantum
V. 3.	"	Acutus
V. 4.	"	Chronicus
V. 5.	"	Symptomaticus

Cognatio secunda Uroplania.

(*Metastasis urinae*)

Characteres.

- 1.^o Secretio urinae suppressa.
- 2.^o Sanguis urinae scetet.
- 3.^o Principia urinae a sanguine in cute deponuntur.

Genera sunt sequentia.

- Gen. 2. Uridrosis (Sudor urinosus)
- Gen. 3. Carcinus (Prurigo scilla)
- Gen. 4. Psodophlysis
- Gen. 5. Pempholyx (Morbus bullorum)
- Gen. 6. Ecthiomemus (Herpes dermatans)
- Gen. 7. Urolonxis (Ulcera urinosa)

Cognatio tertia Menoplasia.

Characteres.

- 1.^o Menstratio modo suppressa modo silet amissa.
- 2.^o Sanguis qui ab utero secretus debet, retinetur, exinde massa sanguinis characteres praebet illius catameniorum.

Genera sunt sequentia.

- Gen. 8. Menidrosis (Sudor cruentus e catamenio suppresso)
- » 9. Menckelia (Macula menstrualis)
- » 10. Menelcosis (Ulcera menstrualia)

Cognatio quarta Galactophoria.

(*Resistens lactis*)

Characteres.

1. Secretio lactis vel immixta aut suppressa est.

2. Cutis sordida vel tantum in una plaga, aut in universo corpore odorem, colorem ac saporem lactis ostendit.

Huc pertineant duo genera.

Gen. 11. *Galactidrosis* (sordor lacteus)

Gen. 12. *Galactophlysis* (vesicula lact.)

ORDO SECUNDUS DERMATOPATHIAS SPECIFICAE.

Characteres. — Dermatopathies non sunt uti in primo ordine corpori homogeneae sed heterogeneae, atque a productis propriis in vita vegetativa ortis constituantur.

Aetiology. — Processus morbosus in dermatopathiis specificis, aut sponte evolvitur, tunc a contagio productus. Natura horum morborum adhuc incerta est; praecipua eorum momenta occasionalia in genere vivendi, et climate quaerenda sunt.

Decursus. — Magis chronicus est quam in primo ordine.

Exitus. — Variat in diversis familiis.

Prognosis. — Sicuti exilis in diversis locis variat, ita quoque prognosim diversam admittunt.

Cura. — Therapia per remedia interna specifica peragitur.

Hic ordo octo familiis comprehendit.

FAMILIA DEGENERENTIA ARTERIOSES.

Characteres.

1. Processus morbosus aetate suam agnoscit in sanguine systematis venae portarum.

2. In systemate venae portarum peculiaris materia morbosus aetate efformatur.

3. Depositio morbosus aliquando ad accessus contingit.

4. Arterioses saepissime ab una ad aliam transeunt partem.

5. Materiae in cutis depositae proprium characterem induunt.

Aetologia. — Aliquando isti morbi hereditarii sunt. Ad momenta vero occasionalia demandantur, aetas protracta, sexus virilis, deficientia motus muscularis, victus luctus, praecipue ex regno animali depreceptus, veneris ac meri abusus.

Decursum. — Variat, modo acutus, modo chronicus est, postremum vero praediligit.

Exitus. — Vel in sanitatem, in alios morbos, vel tandem in mortem abire possunt.

Prognosis. — Reservata requiritur ex eo quod metastases facile orientur.

Cura. — Ante omnia producta morboſa in ſyſtemata venae portarum corrigenda ſunt; regimen dieteticum ſtatim attentioſe meretur; dein therapia cum remediis internis inſtituenda eſt antiarthritica.

Genera ſunt duo.

Gen. 1. *Arthrophyſis* (*Eczema arthriticum*)

Gen. 2. *Arthralgia* (*Ulcera arthritica*)

FAMILIA DECIMAQUINTA HAEMORRHOIDES.

Characteres.

1. Uti in Arthrogiſibus, ita in hæmorrhoidibus peculiaris materia exoritur in ſanguine ſyſtematis venae portarum, et in pluribus ſubſtratis deponitur, atque arthritice ad loca natura acida pellet.

2. Depoſitiones periter ad accenſum contingunt.

3. Organa accenſa ſunt venae et potius hæmorrhoidales.

4. Congeſtiones in toto ſyſtemate venoſo abdominali oriuntur, quare in ipsis varices locum habent; ob hanc rem proctothragiae evolvuntur.

5. Uti itae accretiones ſupprimantur congeſtiones in aliis organis producantur.

6. In regione ſui habetæ ſecreſis qualitativa modo notata, atque exanthema ſuperaccedit.

Ætiologia. — Eodem momento quæ arthrogiſes producere ſolent, quoque hæmorrhoides provocare poſſunt. Hereditarie pariter ſunt.

Decursum. — Est chronicum.

Exitus. — In sanitatem, in alios morbos, vel in mortem.

Pregnans. — Gestatio sem est infans.

Cura. — Requiritur radialis; ratio vivendi corrigenda, plethora abdominalis componenda.

Tria genera habemus.

G. 1. Pygagra (Lichen agrius)

G. 2. Dermathemorrhola (Haemorr. cutanea)

G. 3. Haemorrhoidaleus (Ulcera haemorrhoid-)

FAMILIA DECIMAQUINTA SCROFULOSA.

Characteres.

1. Processus morbosus chyle atque organis accipientibus insidet, nec non in singulis.

2. Scrofulosae per propetum corporis habitum se praebent, ita caput in ratiocin. aliarum partium angustum est, nam crassities, ac labia superiora intumescit.

3. Vita vegetativa potissimum hic patitur.

4. Materia morboza a sanguine recipitur; et postea in diversis organis paulatim deponitur, frequentius autem fit haec depositio in glandulis, membranis mucosis, cuti externa et ossibus.

Aetiology. — Dispositio peculiaris advertitur in aetate juvenili et infanti. Momenta occasionalia sunt: aer humidus, victus perustus ferinusque, aqua corrupta, manditia neglecta, defectus motus etc.

Dacryus chronicus est.

Exitus. — Vel in sanitatem vel in alios morbos aut in mortem terminat.

Cura. — Singularis dyscrasia corrigenda est, materia morboza a corpore eliminanda, ejusque absorptio promouenda.

Tres cognationes habeatur.

Cognatio prima, Psittacus scrofulaceus.

Characteres. — Potissimum in aetate puelli evolvitur, atque contagiosa sunt.

Tria habentur genera.

G. 1. Ficus

G. 2. Albus

G. 3. Rhypha

Cognatio secunda, Tuberculo scrofuloso.

Characteres. — Evolvitur principis post vel ante pubertatem.

Genera habentur tria.

G. 4. Lupus

G. 5. Molluscum

G. 6. Keloid

Cognatio tertia, Forma scrofulosa cutis.

Hae apostumes non a secretion morboza cutis efformantur, nullam habetur exanthema et haud contagiosae sunt.

Genere sunt sequentia.

- G. 7. Scrofulophyma (scrofula testas
cellularis)
- G. 8. Scrofulopychia (scrofula unguium)
- G. 9. Scrofulodermis (Ulcera scrofulacea)
- G. 10. Malacium (Malles bonae)

FAMILIA REGINA SEXTA PSORIDES.

1. Nonnulli credant quod processus morbosus cuti incidat ut verum non est, sed in peculiari singula dyscrasia consistit quae psorica compellatur.

2. Aegrotantes peculiari habitu donantur, colorem cuius terreum ostendunt, musculi sunt debiles, emacatio, maculatio adhaerens una cum somnolentia.

3. Acarus sub epidermide evolvitur.

4. Systema nervosum in compassionem vocatur.

5. Variant sub forma papulae, vesiculae, pustulae, nodi, ac ulcera.

6. Fere semper adjacentes sunt.

7. Ardore ac pruritu constantur, quae phaenomena sub calore adaugmentur.

8. In metastases prorsus sunt.

9. Raro per vires naturales sanantur.

Aetiology. — Duplici modo oriri possunt, vel sponte, vel per contagium.

Praedispositionem inducunt, sexus virilis, homines classe inferioris, opificia nonnulla, sive im-

paris, alimenta depravata, immunditia, et hereditas.

Deseruus chronicus est.

Exitus. — Vel in sanitatem, vel in alios morbos, nec oam in mortem finire possunt.

Prognosis generatim non infesta.

Cura. — Ante omnia potestatis nocentes remouendae sunt, cura vero auxillis tam internis tum externis perficitur.

Genera sunt sequentia.

G. 1. Prurigo (Scabies sicca)

G. 2. Scabies (Scabies vesiculosa)

G. 3. Psora (Scabies humida)

G. 4. Psoraleosis (Ulcers psorica)

G. 5. Serpigo (S. ioceterata)

FAMILIA DECIMA SEPTIMA LEPROSES.

Characteres.

1. Processus morbosus sanguinei ac chyle iohacret.

2. Eruptio symptomatibus gastricis stipata.

3. Productus materia morbose propria, quae in cute depositur, ejus natura vero adhuc nos latet.

4. Uti Arthragoses per accessus quaedamque se manifestat.

5. Systema nervosum quoque patitur, ita ut tremores, coarctationes, anaesthesia oriantur.

Reichles

2°

Ætiologia. — Pœcellarem dispositionem in leprose possunt novellas hereditas conditiones, ætas, temperamentum proprium, et corporis constitutio; magnam vero influentiam exercent hereditas. Momenta occasionalia sunt: aer humidus, vicinitates atmosphæricæ, regiones paludosæ, septentrionales etc.

Decursus semper chronicus est, per totam enim vitam quandoque morbes durat.

Exitus. — In sanitatem, in alios morbos aut in mortem desinit.

Prognosis valde reservata esse debet.

Cura. — Sanguinis dyscrasia corrigenda est, cæterum cura rationalis institueri oportet.

Dux cognationes pertinent ad hanc familiam.

Cognatio prima, Lepros evolutæ.

Characteres. — In hac cognatione symptomata leprose manifestiora sunt, quam in secunda cognatione; atque prodroma antecedunt.

Systema dein nervosum quæ maxime in compulsionem vocatur, et secretiones valde mutantur.

Ad hanc referuntur tria genera.

G. 1. Ophioides (Lepros squamosa.)

G. 2. Elephantiasis

G. 3. Nosolepro

Cognatio secunda, Leproides.

Characteres. — Prodroma quasi deficiunt, vel sunt nullius momenti, systema nervosum illatum remanet, secretio cutanea a norme non recedit; istæ affectiones minori quoque periculo stipantur.

Genera sunt sequentia.

- G. 4. Ichthyosis
- G. 5. Pachydermia (Elephantiasis Arabum)
- G. 6. Leprolepsia (Ulcers leprosa)
- G. 7. Pila

FAMILIA DECIMA OCTAVA TETTHIOSES

HEERSCHEWAMPORREN.

Characteres.

1. In hac familia prodroma occurrunt, uti dolores artuum, symptomata catarrhalia etc.
2. Evolutio materine specificae uti in omnibus apostasibus habetur.
3. Per contagium aliis hominibus morbus communicatur.
4. Systema vasorum raro patitur.
5. Morbi substrata cutis, membranae mucosae, quandoque etiam ossa sunt, raro vero eodem tempore haec systemata insimul corripuntur.
6. Colorem rubro-cupreum praebent.

Aetiology. — Principes dispositio habetur in aetate juvenili; attamen in quocunque vitae tempore occurrere possunt. Momenta occasionalia sunt: aer impurus, aqua et alimenta corrupta, contagium, nonnullae piscium species, quare frequentius ad maris litus observantur.

Decorius est chronicus.

Exitus. — In sanationem, in alios morbos, vel in mortem abeunt.

Prognosis generatim facta est.

Cura. — Causae in primis removendae sunt; internas praesentant diaphoreticas, uti sulfur, decocta specierum lignorum; externas balnea juvant.

Genera sunt sequentia.

G. 1. *Framboesia* (Guineapocken)

G. 2. *Radetype* (Kistenocuche)

G. 3. *Pyrophlyctia* (Feuerbeule)

FAMILIA DECIMA NOVA SYPHILIDES.

Characteres.

1. Fomta morbosae sypphilidis, uti in sanibus dyscrasie in sanguine quaequodae est.

2. Sponte sypphilis nunquam evolvitur, sed per contagium susceptum diffunditur.

3. Affectio localis diversa esse solet.

4. Substrata praecipuum membranae mucosae sunt.

5. Sub hac venerea evolvitur materia specifica quae e sanguine in diversis textibus organis depositur.

6. Depositio modo citius modo serius evenit post primitivam infectionem.

7. Minime ad accessus hae depositiones recurrunt, sed de repente, locum habent.

8. Substrata quae a hac venerea corrigiuntur sunt glandulae, membranae mucosae, cutis, ossa, raro cartilagineae ac textus cellularis.

9. Syphilis primaria nequam cutem foedit, crebris secundaria.

10. Syphilis in cute sub discretissimis formis venit; quarum characteres sequentes sunt:

a. Colore proprio gaudent ex rubro-erythra.

b. Nonnullas regiones praediligunt, uti sunt facies, freni, pinnae aurium, scapulae ac dorsum.

c. Istae impetiginis proprium spargunt odorem.

d. Duratio eorum indeterminata est.

e. Eruptiones absque dolore oriuntur.

f. Nulla metastases obnoxiae sunt.

11. Secretiones in genere mutationes non patiuntur, uti secretio salivae, urinae etc.

12. Ubi syphilis per longum tempus organismo inhæreat, vires exsiccantur.

Ætiologia. — Syphilis uti notum est, nunquam sponte, semper vero per contagium oritur; hoc contagium tamen pro majore vel minore dispositione, facilius aut difficilius suscipitur. Haec vero dispositio dependet ab ætate juvenili, uti teneri etc. etc.

Decursus semper chronicus est.

Exitus. — Vel in sanitatem, vel in alios morbos, aut in mortem terminat.

Prognosis. — Si morbus haud complicatus est, tunc prognostis feliciter adiuvat.

Cura. — Auxilia internis et externis therapia peragitur; specificum dein habetur in mercurio.

Genera sunt sequentia:

- Gen. 1. *Syphilodella* (Maculae est. syphiliticae)
 » 2. *Syphilolepis* (Syphilis est. squamosa)
 » 3. *Syphilopodex* (Syphilis est. papulosa)
 » 4. *Syphilophlysis* (Syphilis est. vesiculosa)
 » 5. *Syphilopemphix* (Syphilis est. bullosa)
 » 6. *Syphilopanthus* (Syphilis est. pustulosa)
 » 7. *Syphiledochilus* (Syphilis est. tuberculosa)
 » 8. *Syphilomyces* (Syphilis est. fungosa)
 » 9. *Syphilophyma* (Syphilis in textu celluloso)
 » 10. *Syphilopsiloma* (Alopecia venerea)
 » 11. *Syphilonychia* (Affectio unguium syphilitica)
 » 12. *Syphiloleosis* (Syphilis est. alutacea)

FAMILIA TUBERCULOSA CARCINOMES.

Characteres.

1. Morbus in sanguine sedem suam uti aliae dyscrasiae habet, sed raro in individuâ robustâ primario modo evolvitur, nam haec sanguis habet a dyscrasiâ syphilitica, scrofulosa, haemorrhoidali, vel poenica oritur.

2. Evolvitur in sanguine materia specifica, quae in uno vel alio organo depositatur.

3. Tres stadia observantur; primum stadium quietis, secundum stimuli, tertium destructionis.

In primo hoc productum parasiticum atque dolore incedit; in secundo dolores lancinantes percutiuntur, in tertio productum morbosum eroditur, et sciam destructivum generat.

4. Ab exordio isti morbi locales tantum sunt, deinde universales fiunt.

5. Cuius vel primario, vel secundario modo in illa insidetur.

6. Minime contagiosi sunt.

Ætiologia. — Aetas præcoca majorem dispositionem in hosce morbos habet; in nonnullis familiæ deinde hæreditario modo evolvuntur. Momenta occasionalia sunt; animi pathemata deprimuntia, paupertas, irritamenta, contusiones, vulnera etc.

Decursum. — Est semper chronicus.

Exitus. — In mortem vix non semper terminatur.

Prognosis. — A sequentibus momentis dependit nempe: a forma, stadio, extensione, colore, momentis occasionalibus, recidivitate, ecc. et pro varietate horum momentorum etiam prognosis diversa esse debet. Generationem tamen infanscit.

Cura. — Ante omnia potestate necentes removendæ sunt; deinde remedia modo interna, modo externa in usum vocantur.

Genera sunt quatuor.

G. 1. Scirrhus (Cancer cutis)

G. 2. Encephaloma (Cancer mollis sanguis cutis)

G. 3. Splenoma (Fungus hæmatodes cut.)

G. 4. Carcinoloma (Ulcus cancerosum cutis)

CLASSIS TERTIA DERMEXANTHESES.

Characteres.

1. Vel sponte, vel per contagium producuntur loci morbi; nunquam primum sedem in cute habent, sed ratione secundaria oriuntur.

2. Nec a sanguinis dyscrasia pignuntur, nec ab apothemibus uti illae secunda classis oriuntur.

3. Semper febril constantior, cujus character, modo rheumaticus, modo estherialis, rursus gastricus, rursus typhoides est.

4. Certa stadia percurrunt.

5. Mutationes quae propter exanthemata in cute occurrunt variant pro eorum diversitate.

6. In omnibus formis cutis vita vegetativa morbose adorta est, ita ut torpor, calor et sensibilitas a norma extollantur.

7. Cutis decoloratio locum habet.

Aetiologia. — Illi morbi vel per contagium susceptum, aut sponte erumpunt. Aetas juvenilis et puella peculiarem dispositionem praebet pro eorum evolutione. Praecipua vero momenta occasionalia in aere, temperie, tempestate, gravio epidemico et morbis progrediens quaerenda sunt.

Decursum. — Semper acutus est.

Exitus. — Vel in sanitatem, vel in alios morbos, vel in mortem fiunt.

Prognosis. — Fere semper reservata requiritur.

Cura. — Causae in primis removeri debent; therapie dein modificatur pro diversitate exanthematum.

FAMILIA VIGESIMA PRIMA RHUMATOSIS.

Characteres.

1. Fomes morbosus rheumaticus inquirendus est in membranis fibrosis, musculis, ligamentis, tendinibus, quae primario modo afficiuntur; membranae serosae ac textus cellularis secundario modo patiuntur.

2. Qualitas sanguinis non est mutata.

3. Systema nervosum plus vel minus afficitur.

4. Per dolores lancinantes, pungentes ac cruciantes, qui modo remittunt, modo intermittunt, et dependent a vicissitudinibus atmosphaericis.

5. In nonnullis systema nervosum, dum in alia magis sanguinem patitur.

6. Exanthemata rheumatica symptomata sequentia communia habent.

a) Febre doloribus fixis aut vagis stipata.

b) Oriantur sub copiosa cutis secretione acida.

c) Decursus eorum minime ad certa temporis spatia coeretur sicuti in ceteris familiis hujus classis.

d) Liquidum in exanthematibus contentum, uti acido, reagit.

e) Magnam ad metastases ostendunt vim.

Aetologia. — Cutis in transpirationem valde prompta, magnam dispositionem ponit in haec morbos; hinc infantes ac senes facilius aggrediuntur. Ad momenta occasionalia referuntur nimium, electricitas, ac tempestas activa.

Decursum generalem est acutus.

Exitus vel in sanitatem vel in alios morbos est.

Prognosis reservata requiritur quia metastases facile oriuntur.

Cura in prophylactico et therapeutico conjungitur.

Sedulo cavendum est a frigore et humido atmosphærico, ne hujusmodi affectiones evolvantur.

Si vero morbus jam viget diaphoretico mitiore antiphlogistico atque purgante leniori succeditur.

Genera sunt tria.

G. 1. *Milliaria*

G. 2. *Rheumatobuli* (*Roseola rheumatica*)

G. 3. *Plantaria*

FAMILIA TIGESIMA SECUNDA CATARRHICES.

Characteres.

1. Substratum quod potissimum in hac familia patitur est membrana mucosa organorum respiratorum.

2. Affectio modo ad unam partem coarctatur, alius ad totam adpartem respiratoriam diffunditur.

3. Sensibilitas membranæ mucosæ morbose adeo est, uti patet a tussitione et ardore.

4. Non inflammatio, sed simplex congestio in membrana mucosa habetur.

5. Inebescens congestione, secretio quoque in-
laudatur, quae tunc exhalat.

6. Muci secretio quoad quantitatem et quali-
tatem alteratur, ita ut ab exordio viscus tenax
quasi vitreus est, dein crassior atque tenax evadit.

7. Ab hinc interius affectionibus cutis quoque
in concessum trahitur.

Aetologia. — Omnia individua in hanc af-
fectionem disposita sunt, praesertim sub aetate
puerili ac juvenili.

Ad momenta occasionalia demandantur vicis-
situdines atmosphaericae, acuta tempestas, at-
que genus epidemicum.

Decursum scutus est.

Exitus. — In sanitatem, in alios morbos, nec
non in mortem abire potest.

Prognosis generalis est laeta, si vero com-
plicationes occurrant, tunc reservata requiritur.

Cura. — Si morbus decursum regularem ab-
solvit, vires medicatrices naturae sufficient; si
vero complicationes occurrant, diversis therapia
indigamus.

Ad hanc familiam pertinent *Morbilli*.

FAMILIA VIGESIMA TERTIA DYSPNOEATORUM.

Characteres.

1. Fomes morbosus in membranis mucosae tubi
gastro-enterici inheret, cujus secretis adhaesit
atque qualitative modo alterata est.

2. Natura muci secreti, non ad in alia secretionibus gastricis vel acida, vel alcalis, sed semper alcalis est.

3. In omnibus morbis hujusce familiae hepar prae ceteris organis in compressionem vocatur.

4. Sanguinis indoles mutatur, quod in aliis morbis gastricis non evenit.

5. Systema nervosum plus minove patitur.

6. Hi omnes morbi cutanei semper secundario modo oriuntur.

7. Si erysipelatosi ad altissimum perveniunt gradum, membranae serosae intumescentes haud evadunt.

8. Quam maxime metastasibus obnoxii sunt.

Aetiology. — Homines temperamento cholericis densi, cum prevalentia systematis venae portarum peculiarem dispositionem habent in hos morbos. Momenta occasionalia sunt: aer humidus, calidus, nec non vicinitudines atmosphaericae animi pathemate, errores dietetici etc.

Decorum est scire.

Exitus. — In mortem, in alios morbos vel in mortem terminat.

Prognosis. — Causae remotas sunt, dein regimen dieteticum congruum observare oportet; affectiones membranae mucosae mitigandas sunt; cum dein antiphlogisticis et diaphoreticis requiritur.

Comprehendit haec familia tres cognationes.

Cognatio prima, Erysipelas glabrum.

Characteres.

1. Forma hujus exanthematis est maculosa; maculae vero digito perfricando evanescunt, ablatâ pressione redeunt.

2. Nunquam vesiculae, aut bullae ostendunt, et quam maxime in metastasi prope sunt.

Habentur genera quatuor.

G. 1. Erysipelas

G. 2. Erythema

G. 3. Scarlatina

G. 4. Rubella

Cognatio secunda, Erysipelas elevatum.

Characteres. — Exanthemata ad hanc cognitionem spectantis, veniunt sub forma pomphi, vesiculae et bullae super maculam rubram insidentis, quae ardoris sensu in cute coarctantur, et si fluidum continent semper naturam aculei exhibent, deinde exsiccantur et crustam flavescens aefformant.

Genera sunt sequentia.

Gen. 5. Urticaria

» 6. Phlyctenosis

» 7. Zoster

» 8. Pemphigus.

*Cognatio tertia forma variolosa.**Characteres.*

1. Sunt vesiculae ab exordio halone rubro circumdatae, quae dein in pustulas abeunt, contentum ab initio limpidum est, postea puriforme fit et naturam exhibens albedinam.

2. Certa studia percurrunt, atque in cicatrices terminant.

Comprehendit quatuor genera.

Gen. 9. Varicella

Gen. 10. Variola

Gen. 11. Variolois

Gen. 12. Vaccina

FAMILIA VIGESIMAQUARTA TYPHOSES.

1. Substrata quae a fomite typhoso aggredduntur sunt membranae mucosae, sanguis atque systema nervosum.

2. Passio sanguinis primario modo locum habet.

3. Crasis sanguinis morbose alienata est.

4. Systema nervosum praeter cetera valde patitur, quod haud parum pendet a sanguinis pervertita crasi; ideo affectio systematis nervosi secundario modo oritur.

5. Membrana mucosa praesertim tubi intestinalis in ultimis morbi studiis quam maxime afficitur.

6. Mutationes, quae in membrana mucosa occurrere possunt sequentem attentionem merentur.

- a. Evolvuntur maculae circumscriptae.
- b. Quandoque depositiones sub forma carbunculī contingunt, quae in gangraenam abeunt.
- c. Maculae colorem rubrum habent.
- d. Quandoque pseudo-membranae efformantur.
- e. Nullo aut exiguo tantum dolore comitantur.
- f. In cute maculae coloris rubro-fusci oriuntur, quae ad retropulsionem prone sunt.
- g. Nullis doloribus comitantur.
- h. Nullam praesedunt cutis regionem.
- i. Quandoque tantum ad superficiem cutis circumscribuntur, alias autem totam quoque cuticulam sub cuti rigentem invadunt.

Aetiology. — Typhoides vel sponte vel propter contagium evolvuntur.

Spontanea evolutio dependet a dispositione individuali, ab aetate, aetate, temperamento.

Momenta externa sunt miasmata, aer humidus paludosus, mephiticus, clima, alimentorum penuria etc.

Decursus acutus est.

Exitus. — In sanitatem, in alios morbos, aut in mortem terminat.

Prognosis valde reservata requiritur.

Cura partitur in prophylacticam et therapeuticam; ad primam pertinet remotio potentiarum nocentium. Quoad secundam congestionem sanguinis inferre; angustis dyscrasiam corrigere, et affectiones membranarum mucosarum per antiphlogisticas debellare.

Ad hanc familiam tria genera pertinent.

Gen. 1. Porphyrotypus
(Typhus exanthematicus)

Gen. 2. Anthracotypus
(Pestis bubonica)

Gen. 3. Ochrotypus
(Febris flava)

THESES DEFENDENDAE.

1. *Morbi cere nervosi plerumque sunt intermittentes.*
Morbi cere intermittentes plerumque sunt nervosi.
2. *Nervosa intermittentes sunt vel febriles, vel a febrilibus.*
3. *Nervosa intermittentes febriles injustissime dicuntur febres intermittentes.*
4. *Nervosa intermittentes ex affectione gangliari derivandae esse videntur.*
5. *Nervosa gangliaria intermittentes cerebrales quasi nunquam, nervosa gangliaria intermittentes abdominalis quasi semper cum febre decurrunt.*
6. *Febris non alibi major est minor esse, nunquam autem characteris qualitatem habere potest.*
7. *Catarethae hinc febris et rheumatice nemini catarrhus febrilis et rheumatici audire possunt.*

